

Stand:

- | o.B. | path. | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Beckenstand: tief: re. / li. cm |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | WS - Profil: Skoliose..... Hyperkyphose/ lordose..... Flachrücken |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Lot (C7-Rima ani): Abweichung: re. / li.cm |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Romberg - Test: |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Fersenfallschmerz |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | „nonorganic sign“: <i>axial loading</i> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | passiver Bewegungsschmerz:
Rotation: re. / li. Reklination: <input type="checkbox"/> pos. Kemp-Zeichen: re. / li. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | „simulierte Rotation“ |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bewegungsumfang: Seitneigung: Rotation:
re. / li.:°/.....°/.....° re. / li.:°/.....°/.....° |
| ⇒ | | FBA: cm |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Schober: 10 / cm
Rippenbuckel:
Lendenwulst:..... |
| | | Kletterphänomen: <input type="checkbox"/>
Ott: 30 / cm |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Venenstatus: Varikosis Grad (I-IV) : re. / li. |

Gang:

- Blindgang:**
- Hinken:** Trendelenburg / Duchenne re. / li.
- Gangvarianten:**
Zehengang (S1): Hackengang (L4/5): Stuhlsteigttest (L3/4):

Rückenlage:

- Lasègue (SLR)** re. / li.° gekreuzt pos. Bragard „overreaction“
- Slump-Test:** re. / li. pos.
- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Hüfte: Flex / Ex re.°/.....°/.....° li.°/.....°/.....° |
| | | IR / AR bei 90° re.°/.....°/.....° li.°/.....°/.....° |
| | | Abd / Add re.°/.....°/.....° li.°/.....°/.....° |
- DS:** Trochanter: re. / li. Leiste: re. / li.
Bruchpfoten: re. / li. :

o.B. path.

Reflexe: PSR..... / ASR

pathologische Reflexe: ggf. Anal-Reflex - bzw. tonus:

Bändertest:

Lig. iliolumbale: re. / li. | Lig. sacrotuberale: re. / li. | Lig. sacroiliaca: re. / li.

segmentale Bewegungsstörung (Blockierung):

variabl. Beinlängendifferenz: („Langsitz“ möglich: ja nein)

<input type="radio"/> <input type="radio"/> Motorik:	Iliopsoas (L 1-3):	0 1 2 3 4 5	re. / li.	Adduktoren (L 2-4):	0 1 2 3 4 5	re. / li.
Kraftgrade	Quadriceps (L 3-4):	0 1 2 3 4 5	re. / li.	Tib. ant. (L 4):	0 1 2 3 4 5	re. / li.
0 - 5	EHL (L 5):	0 1 2 3 4 5	re. / li.	Peronei (S 1):	0 1 2 3 4 5	re. / li.

Sensibilität: siehe Untersuchungsbogen / nicht segmental

Koordination: Hacke-Tibiakantenversuch: re. li.

Perfusion: abgeschwächt A. re. / li.

Kapillarfüllung: verzögert re. / li.

Bauchlage:

PKB (prone knee bend / umgekehrter Lasègue): re. li.

3- Stufentest: Hüfte re. li. | ISG re. li. | untere LWS re. li.
(Mennell)

muskulärer Hartspann: re. li. Höhe.....

DS: inter-supraspinal..... **Facetten:** _____ re. li.

iliolumbal: re. li. Valleix-Punkte: re. li.

ISG: re. li. Glutealmuskelansätze: re. li.

sonstiger DS:

„nonorganic tenderness“

Nierenlager: **DS:** re. / li.

Sonstiges / Anmerkungen:

DIAGNOSE:

Datum:

_____ untersuchender Arzt